



VACINA JANSSEN | JOHNSON & JOHNSON

INSTRUÇÃO DE MANUSEIO

DESCONGELAMENTO



- No estado de Pernambuco, a etapa de descongelamento será iniciada na Rede de Frio nacional ou estadual. Dessa forma, não se faz necessário o descongelamento pelos municípios.
- Os municípios deverão armazenar a vacina em câmara refrigerada de 2°C a 8°C por até 4,5 (quatro meses e meio).

PREPARO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,5 ML DA VACINA JANSSEN

- A vacina deve apresentar-se como uma suspensão incolor a ligeiramente amarela, transparente a muito opalescente.
- Inspeccionar visualmente o frasco para detecção de partículas e descoloração. Se alguma destas condições existir, não administrar a vacina.



INSPECIONAR O FRASCO PARA DETECÇÃO DE PARTICULAS E DESCOLORAÇÃO

- Homogeneizar a suspensão suavemente. Não Agite!



HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE. NÃO AGITE!



RETIRE 0,5ML DA VACINA

- Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão antisséptico de uso único.
- Retire 0,5 ml da vacina utilizando uma seringa de 3 ml e agulhas de 20x5,5dec/mm ou 25x6,0 dec/mm.



REGISTRE A DATA E HORA DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO NO RÓTULO DO FRASCO. USAR NO PRAZO DE 6 HORAS.

- Os frascos devem ser registrados com a data e a hora da primeira utilização no rótulo do frasco.
- Após abertura do frasco conservar de 2 °C a 8 °C e utilizar dentro de 6 horas.

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA

- Verifique o volume de dosagem final de 0,5 ml.
 - Confirmar que não existem partículas e que não é observada descoloração.
- Não administrar se a vacina apresentar descoloração ou contiver partículas.
- Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte superior do braço.



ADMINISTRE 0,5 ML VACINA POR VIA INTRAMUSCULAR (IM).

ATENÇÃO!

Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,5ml, descarte o frasco e qualquer volume remanescente.

Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 6 horas.



- Cada frasco contém 5 doses.
- Cada dose a ser administrada deve conter 0,5 ml de vacina.
- A vacina possui DOSE ÚNICA.