


# VACINA

## ASTRAZENECA

•A vacina covid-19 (recombinante) é uma vacina composta por um único vetor de adenovírus recombinante de chipanzé, deficiente para se replicar, que estimula anticorpos e resposta imune celular contra o coronavírus.

•A eficácia e qualidade da vacina foram garantidas pela Agência Sanitária de Vigilância Sanitária (ANVISA).




### A PARTIR DE QUE IDADE PODE TOMAR A VACINA?

A idade recomendada é acima de 18 anos.



### COMO É ADMINISTRADA A VACINA?

Serão administradas 2 (duas) doses com intervalo de 60 dias, no músculo do braço.



### SE A PESSOA ESTIVER COM UMA DOENÇA FEBRIL AGUDA OU GRAVE, PODE TOMAR A VACINA?

Não. A vacinação deve ser adiada em pessoas que apresentem febre aguda grave ou infecção aguda até a resolução do quadro.



### EM QUE SITUAÇÕES A VACINA ESTÁ CONTRAINDICADA?

- Menores de 18 anos;
- Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina;
- Gestantes e puérperas;
- Pessoas que apresentaram trombose associada a plaquetopenia após a primeira dose desta vacina.



### QUAIS AS POSSÍVEIS REAÇÕES ADVERSAS PODEM OCORRER APÓS A VACINAÇÃO?

As reações mais comuns são: sensibilidade e dor no local da injeção, dor de cabeça, fadiga, dor no corpo, mal-estar, febre, calafrios, dor nas articulações e náuseas.

- As reações desaparecem alguns dias após a vacinação.
- Se persistirem ou surgir outras reações, procurar um serviço de saúde mais próximo.



### QUANTO TEMPO, APÓS A SEGUNDA DOSE, A PESSOA ESTÁ IMUNIZADA?

Após a 2ª dose, deve aguardar pelo menos 14 (quatorze) dias para estar imunizado(a).

### MESMO QUEM JÁ FOI VACINADO DEVE MANTER OS CUIDADOS CONTRA A COVID-19?

Sim.

Devemos manter os cuidados de prevenção como:

Usar máscara;

Lavar as mãos;

Higienizar as mãos com álcool em gel e

Manter o distanciamento.



**IMPORTANTE! A VACINA É SEGURA E NÃO CAUSA COVID-19.**