



ASTRAZENECA - VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) FIOCRUZ/ COVAX/ SERUM INSTITUTE OF INDIA

INSTRUÇÃO DE MANUSEIO

ARMAZENAMENTO



- A vacina deverá ser armazenada em câmara refrigerada a uma temperatura de +2°C a +8°C, protegida da luz, com prazo de validade de 6 meses a partir da data de fabricação.

PREPARO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,5 ML DA VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE)

- Realizar a higienização das mãos.

- A vacina deve apresentar-se como uma suspensão incolor a levemente marrom, clara a levemente opaca.

- A vacina deve ser inspecionada visualmente quanto a partículas e descoloração antes da administração. Descartar o frasco se a suspensão estiver descolorida ou partículas visíveis forem observadas.



DESCARTAR SE SUSPENSÃO
DESCOLORIDA OU PARTÍCULAS VISÍVEIS
FOREM OBSERVADAS.



HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE.
NÃO AGITE!

- Homogeneizar a suspensão suavemente. Não Agite!

- Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão antisséptico de uso único.
- Retire 0,5 ml da vacina utilizando uma seringa de 3 ml e agulhas de 20x5,5 dec/mm ou 25x6,0 dec/mm.



RETIRE 0,5 ML DA VACINA.



REGISTRE A DATA E HORA DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO NO
RÓTULO DO FRASCO

- Os frascos devem ser registrados com a data e a hora da primeira utilização no rótulo do frasco.
- Após abertura do frasco conservar de +2 °C a +8 °C e utilizar em até 48 horas (Fiocruz) e até 6 horas (Mecanismo Covax ou Serum Institute of India).

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA

- Verifique o volume de dosagem final de 0,5 ml.
 - Inspecionar visualmente quanto a partículas e descoloração antes da administração.
 - Descartar o frasco se a suspensão estiver descolorida ou partículas visíveis forem observadas.
- Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte superior do braço.



ADMINISTRE 0,5 ML VACINA POR VIA INTRAMUSCULAR (IM).

ATENÇÃO!

Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,5 ml, descarte o frasco e qualquer volume remanescente.

Não é permitida a mistura de diferentes frascos para compor 1 dose.

Descartar qualquer vacina não utilizada caso o frasco tenha sido aberto em um prazo maior do que 48 horas (Fiocruz) e 6 horas (Mecanismo Covax, ou Serum Institute of India).



- Cada frasco contém 5 doses (Fiocruz) e 10 doses (AstraZeneca ou Serum Institute of India).
 - Cada dose a ser administrada deve conter 0,5 ml de vacina.
- O esquema vacinal corresponde a DUAS DOSES (D1 + D2)
- Intervalo de 12 semanas entre as doses.