

VACINA ADSORVIDA (INATIVADA) SINOVAQ/ BUTANTAN PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS (exceto imunossuprimidos)

- INSTRUÇÕES DE MANUSEIO -

ARMAZENAMENTO




Armazenar por até 12 semanas à temperatura de 2 °C a 8 °C

- A vacina deverá ser armazenada em Câmara refrigerada na temperatura entre 2°C e 8°C por 12 semanas a partir da data de fabricação.

MANUSEIO



- O frasco multidose possui o conteúdo para extração de 10 doses de 0,5 ml;
- Utilizar técnica asséptica para o preparo da vacina;
- Homogeneizar suavemente;



- Com o frasco em posição vertical (reta) (ângulo de 90°), insira a seringa de 1ml ou 3 ml para aspiração da dose;
- Introduza a agulha no frasco na região lateral circundante ao centro delimitado, em locais diferentes a cada aspiração, evitando a parte central da tampa;
- Retire a dose de 0,5 ml utilizando seringas de 1ml ou 3 ml e a agulhas (20x5,5 dec/mm, 25x6dec/mm, 25x7dec/mm). Caso ocorra aspiração de volume superior a 0,5ml ou haja bolhas de ar no interior da seringa, o volume da dose (0,5 ml) deve ser corrigido com a agulha ainda dentro do frasco;
- Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltoide, na parte superior do braço.
- Após abertura do frasco multidose conservar entre +2 °C a +8 °C e utilizar em até 8 horas.

ATENÇÃO

- Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,5 ml, descarte o frasco e qualquer volume remanescente.
- Não é permitida a mistura de diferentes frascos para compor 1 dose.
- Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 8 horas após abertura do frasco.
- A dose deve ser aspirada imediatamente antes da administração da vacina, não podendo ser previamente preenchida.
- Esta vacina não deve ser utilizada caso haja alteração na coloração ou presença de partículas estranhas.
- O esquema da vacina é de 2 doses (0,5 ml cada) com intervalo de 28 dias.