



VACINA PFIZER | COMIRNATY

INSTRUÇÃO DE MANUSEIO

DESCONGELAMENTO



- No estado de Pernambuco, a etapa de descongelamento será iniciada na Rede de Frio estadual. Dessa forma, não se faz necessário o descongelamento pelos municípios.
- Os municípios deverão armazenar a vacina em câmara refrigerada entre 2°C e 8°C por 31 dias.
- Antes da diluição, a dispersão descongelada pode conter partículas amorfas e opacas de cor branca a esbranquiçada.

DILUIÇÃO

Diluir a vacina no frasco original com 1,8 ml de solução injetável de cloreto de sódio

- 9 mg/mL (0,9%), utilizando uma seringa de 3 ml ou 5 ml e agulha de calibre igual ou inferior a 21 gauge e técnicas assépticas.



COLOQUE 1,8 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% DENTRO DO FRASCO

Igualize a pressão do frasco antes de retirar a agulha do batoque de


- borracha do frasco, retirando 1,8 ml de ar para dentro da seringa de diluição vazia.



PUXE O ÊMBOLO ATÉ 1,8 ML PARA RETIRAR O AR DO FRASCO

- Homogeneizar a dispersão suavemente. Não Agite!

- A vacina diluída deve apresentar-se como uma dispersão esbranquiçada, sem partículas visíveis.
- Descarte a vacina diluída se observar a presença de partículas ou descoloração.



HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE. NÃO AGITE!

- Os frascos diluídos devem ser registrados com a data e a hora de abertura do frasco no rótulo.

- Após a diluição conservar entre 2 °C e 8 °C e utilizar dentro de 6 horas.

- Permitir que a dispersão diluída atinja a temperatura ambiente antes de ser utilizada.



REGISTRE A DATA E HORA DE ABERTURA DO FRASCO NO RÓTULO. USAR NO PRAZO DE 6 HORAS APÓS A DILUIÇÃO.

PREPARO DE DOSE INDIVIDUAL DE 0,3 ML DE VACINA – COMIRNATY

- Após a diluição, o frasco contém 2,25 ml com possibilidade de extração de 6 doses de 0,3 ml cada.
- Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão antisséptico de uso único.
- Retire 0,3 ml da vacina diluída utilizando uma seringa de 1 ml e agulha de calibre igual a 23 ou 25 gauge.
- Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte superior do braço.



0,3 mL DE VACINA DILUÍDA

ATENÇÃO!

Seringas e agulhas de baixo volume morto devem ser utilizadas. Caso seringas e agulhas padrão forem usadas pode não haver volume suficiente para extrair a sexta dose do frasco.

Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,3 ml, descarte o frasco e qualquer volume remanescente.

Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 6 horas após a diluição.



- Cada dose a ser administrada deve conter 0,3 ml de vacina.
- O esquema da vacina é de 2 doses (D1+ D2).
- O intervalo entre as doses é 12 semanas, oriente os usuários.